

QUÉ HACER CUANDO LAS ABEJAS ATACAN



Abeja recogiendo el polen de una flor.

Un día de tantos frente al edificio de Escuela para Todos vimos pasar un enorme enjambre de abejas. Los más viejos dijimos: qué ruido más extraño hacen y vuelan distinto a como lo hacían las abejas de antes. Y eso es cierto. Ya no son las mismas abejas de antes.



Abeja de Castilla o Italiana.

Casi todas las colmenas se han cruzado con abejas africanizadas. Por eso se han vuelto más agresivas. En los últimos años, en Centroamérica hemos tenido que lamentar muchas muertes debido a las abejas. Se han convertido en una plaga, a pesar de su gran producción de miel. Estas colmenas cruzadas se establecen en cualquier lugar. Por eso hay que aprender a defenderse de ellas. Muy importante es poder distinguir un enjambre temporal.

Los enjambres temporales van de paso. Van en busca de una zona que tenga suficiente alimento, para hacer allí la colmena. Cuando eso, se sitúan en las ramas de los árboles, en los techos, en los postes, en las puertas, en las mallas de los portones y en otros lugares parecidos. Se amon-

tonan alrededor de la reina y se pueden quedar algunas horas, y a veces hasta tres días. A menudo después siguen su camino. Estos enjambres no son peligrosos para las personas ni para los animales. Como aún no han hecho un pánal, no han guardado alimento y la reina no ha empezado a poner huevos, no tienen nada que defender. Sólo atacarán si se sienten amenazadas.

Hoy en día es indispensable hacerle ver a los niños que no deben molestar a un enjambre de abejas, por más ganas que tengan de tirarle una piedra o un flechazo. Al sentirse amenazadas, pueden atacar en un "santiamen" y causar la muerte. Hay que esperar uno o dos días, pues tal vez se van a otro lugar. Si después de dos días no se han ido, se puede atomizar el enjambre con una bomba de fumigar. Se puede usar diesel, gasolina, un insecticida o agua con jabón en polvo, pero bien espesa.

También se puede quemar el enjambre con un mechón de trapos amarrados a una varilla larga. Se humedecen con diesel, gasolina o aguarrás para que ardan bien.

Pero fumigar o quemar el enjambre, sólo se debe hacer por la noche. Con la oscuridad las abejas se atontan y casi no pueden volar. Pero siempre es bueno protegerse la cara, los brazos y los pies.

Abeja cuida los huevecillos.

Abejas cuidando a la reina.



Los enjambres permanentes son los que ya han hecho colmena. Si las abejas tienen más de tres días de estar en el mismo lugar, ya han comenzado a hacer colmena. Ya se han acomodado en el hueco de un tronco o en un estañón, o en huecos de las paredes de madera, en un cielo raso, debajo del piso, en los postes, en árboles o en el hueco de una alcantarilla. Ya están acumulando alimento y la reina ha empezado a poner. Entonces se vuelven muy agresivas. Estos enjambres permanentes son los que han causado la muerte de personas y de animales.

Como las abejas no se alejan a más de 3 kilómetros de su colmena, no es un imposible encontrarla. Pero no hay que acercarse ni hacer ruidos que las puedan alborotar.

Si hay animales domésticos en las cercanías, hay que mantenerlos sueltos para que puedan huir en caso necesario.

Nunca hay que intentar destruir el panal durante el día. Tampoco lo debe intentar cualquier persona, como por ejemplo un joven inexperto o un niño. Lo peligroso es la violencia con que atacan estos animales. Lo mejor sería buscar a una persona con experiencia en el manejo de abejas.

Qué hacer si lo atacan las abejas

Lo primero es huir y meterse en una casa o bodega y cerrar todo para que no lo puedan seguir. Si no hay donde guarecerse, se debe correr rápidamente en ZIG-ZAG, o lanzarse al agua si cerca de allí hay un río o una pila. Si hay una persona cerca que pueda y quiere ayudar al atacado, le puede tirar colchas o cobijas para que se envuelva. Pues al picar, ellas dejan también una sustancia olorosa que es como un aviso para indicarle a las otras en dónde está el enemigo que hay que atacar.



Especialista quitando un enjambre de abejas africanizadas.

Si a una persona la pican menos de 10 abejas, lo que puede hacer es quitarse los aguijones raspando con la uña y ponerse hielo en los piquetes. No se debe sacar el aguijón con pinzas, pues se rompe y se riega más el veneno. Pero si la persona es alérgica al veneno de abejas se le deben dar inmediatamente medicinas como Clorotrimetón de 8 miligramos, o Benadryl de 25 miligramos o cualquier otra que indique el médico o el asistente de salud. Los adultos pueden tomar 2 pastillas juntas y los niños una pastilla. Si tienen menos de 6 años se les debe dar la medicina en jarabe especial para niños.

En personas alérgicas, hasta tres piquetes pueden ser un peligro. Por eso es conveniente que las personas que viven en lugares alejados o que tienen que viajar a sitios retirados tengan siempre esas medicinas a mano. Son medicinas baratas y pueden salvar una vida.

En caso de que una persona se vea atacada por muchas abejas, se le deben dar las mismas medicinas y llevarla inmediatamente al centro de salud más cercano.

Una última recomendación: en nuestras tierras existe una gran cantidad de abejitas silvestres criollas. Estas abejitas no se cruzan con las africanizadas y no tienen aguijón. No pueden picar. Son más pequeñas que las de castilla. Es importante aprender a reconocerlas. Esto lo decimos sobre todo a la gente de la ciudad. No se deben matar abejas que no ofrecen ningún peligro. Más bien son una gran ayuda para los agricultores, pues al visitar las flores ayudan a polinizarlas y a formar los frutos. Además su miel es muy sabrosa y medicinal.



Abejas en su colmena.