


GASTROENTERITIS O INFECCIÓN INTESTINAL



Mientras esta enfermedad siga matando a cientos de niños, seguiremos publicando esta página. Pues de repente un niño amanece enfermo, los padres no tienen las pastillas en la casa y tampoco se acuerdan cómo se llaman y tal vez viven a muchas horas de algún Centro de Salud. Por eso: si tienen niños pequeños, tengan a mano pastillas de TRIMETO-PRIMA.

La gastroenteritis comienza con diarrea. Las heces son aguadas, de color verdusco y tienen mal olor. El niño vomita

o bota con la diarrea cualquier alimento. A un niño de dos a seis meses de edad se le da un cuarto de pastilla cada seis horas. Se muele bien y se le da en un poquito de agua tibia hervida. Si la vomita, algo le queda en el estómago. La segunda toma generalmente ya no la vomita. Casi siempre a las 24 horas se paran los vómitos y la diarrea. Entonces se le puede dar atol de maíz. El tratamiento hay que darlo durante cinco días seguidos.

Lo más peligroso de esta enfermedad es que por la diarrea y el vómito se le espesa la sangre al niño y esto le puede causar la muerte. Un niño pequeño necesita tomar por lo menos un litro de líquido al día. Lo mejor es darle suero. Pero si no hay suero, se le puede dar agua de arroz o agua de coco. Hay que darle una cucharadita cada cinco minutos hasta que comience a orinar normalmente.